「DONET(地震・津波観測監視システム)について」

金田 義行

香川大学

地域強靱化研究センター

海洋研究開発機構

2017年2月15日 DONET研究会シンポジウム

震源域直上におけるリアルタイム地殻変動観測の実現

- リアルタイムモニタリングが可能
 - プレート境界の固着, すべり状態は地殻変動(陸上だけでなく海底ケーブルにより海底も)のリアルタイム観測データから推定可能
- 南海トラフ沿い巨大地震震源域の真上でリアルタイム観測
 - DONETは2011年から稼働中
 - DONET2は敷設中(来年度完成予定)

地震・津波観測監視システム

Dense Ocean floor Network system for Earthquakes and Tsunamis
先端技術を用いた地震津波の常時監視

古江陸上局
Furusu-cho
古江

拡張用分岐機構

分岐装置

Node A
Node B
Node C
Node D
Node E

1900m

4300m

Spineault

Philippine Sea Plate

地動センサシステム

圧力センサシステム

Extension Cable

基幹ケーブル

海底で設置作業を行うROV

DONET 地震・津波観測監視システム

Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis

科学・技術の統合
地震発生現場での観測
早く伝える
リアルタイムデータの活用

省ら 将来の地震発生シナリオが絞り込めない場合でも
備えるべきことは山積している。

海RCハ

観測ネットワーク設置海域

■古江陸上局 DONETによる海域モニタリングの発信拠点

局舎は賃貸契約
尾鷲市はDONETのために
土地を無償貸与

非常用発電機の導入 3日間の停電対応

局舎内設備監視 5

海中ロボットを使った作業風景

地震波即時検知能力の向上

赤色が濃い位置ほど、陸上観測点より早く信号をキャッチすることを示す

津波即時検知能力の向上

地震津波シミュレーション 熊野灘

伊勢湾の津波シミュレーション(満潮位)

伊勢湾全体 … 地形分解能:50m格子

伊勢市 鳥羽市 志摩市

サミット会場(賢島)
訪問地(真珠島)
宿泊地(志摩市?)
を対象にした予測

定常点候補

- ・鳥羽市役所沖
- ・五十鈴川河口
(伊勢市役所)
- ・志摩磯部(近鉄線
沿線)

DONETの利活用 ー尾鷲津波浸水予測ー

リセット 観測時刻 2015/03/03 10:29:08 (00:00:03 前) x1 ログを表示 設定

津波到達予想

観測点・観測値

＊入力波高に対する津波増幅率を事前にシミュレーションで計算しておき、リアルタイムデータに従って1秒毎に津波高・到達時刻・浸水マップを更新

実際に起こった地震津波現象を複数の津波シナリオで浸水域を想定
そのためには精緻な津波シミュレーションとリアルタイムデータが不可欠

kushimoto1
kushimoto2

津波	津波計算中 (2015-03-03 10:14:10.000)
地震	未検知
震源日時	
規模	
緯度	
経度	
深度	
方向	

表示時間は100倍の速さにしている

和歌山県はこのシステムを導入

南伊勢町(五ヶ所湾)

支配方程式:

非線形長波理論

数値解法:

平面2次元差分法

震源モデル:

内閣府モデル(2012)

のケース3

地震・津波の総合災害ポテンシャル評価研究

DONET利活用システム開発 三重県システムの構築

鳥羽市

支配方程式:

非線形長波理論

数値解法:

平面2次元差分法

震源モデル:

内閣府モデル(2012)

のケース1

地震・津波の総合災害ポテンシャル評価研究

DONET利活用システム開発 三重県システムの構築

地震・津波の総合災害ポテンシャル評価研究

DONET利活用システム開発 三重県システムの構築

DONETデータ伝送ポンチ絵

4月1日三重県南島沖地震 ($M_{JMA} 6.5$)

赤：本震&余震 (2016.04.01 11:39-17:05)
 黒：M>1.5, 深さ< 30 km, 2004.01.01-2016.03.31

海底ケーブルネットワーク (DONET1) の真下で発生

・1944年東南海地震のすべり分布の縁で発生

Ichinose et al. (2003)

・すべり遅れ分布の縁 (海側) でもある

Yokota et al. (2016)

2016年4月1日 三重県南東沖の地震 (NIED+JAMSTEC)

観測点番号

DONETによる地殻変動リアルタイム連続観測

- ・本震と余震は離れて発生
 - ・本震時と同程度か上回るくらいの余効変動 (どちらも沈降) がDONETでとらえられた
 - ・4/3から海側でVLF(超低周波地震)が活発化
- 余効すべりが本震より海側に伝播の可能性

震源域内でM6クラス地震が起きた後の推移（2つのシナリオ）

- ・4/1と類似の場合
- ・余効すべりが海側にのみ広がり再び固着状態に戻る

- ・固着が弱い状況
- ・余効すべりが陸側にも広がり、数年後にM8クラスの地震が発生

成果トピックス2: 次の南海トラフ地震の発生予測

☆南海トラフ地震で注視すべき要素
 ・M7地震(日向灘地震等)の南海トラフ地震への影響

JAMSTEC

地震発生サイクルシミュレーション

兵藤・堀 (JAMSTEC)

海底地殻変動観測 (DONET 3)

余効変動モニタリングの必要性

期待される地殻変動観測データ

紀伊半島西沖では、東南海地震の余効すべり後の加速が観測できると期待される。

東南海地震発生後から南海地震発生に至るまで

熊野灘では東南海地震の余効すべりが観測される。

逐次同化手法の有効性の数値実験による検証

東海(東南海)地震後の南海地震発生時期の予測

減災科学(レジリエンス・サイエンス)の概要